

● こなぐすりと服薬補助食品との飲み合わせ（おいしさの相性）

当センター採用の抗菌薬について、各種飲食物との飲み合わせをご紹介します

注意事項：・各種飲食物は、飲ませる直前に混ぜて、長時間放置しないようにしてください

・くすりの好き嫌い、味の好みには個人差があるため、この一覧表のとおりにはいかない場合もあります

2017.1作成

商品名	香り・味	苦味	ざらつき	水	茶	オレンジジュース	リンゴジュース	スポーツドリンク	牛乳	ヨーグルト	練乳	バナナアイスクリーム	チョコアイスクリーム	プリン	服薬補助ゼリー(イチゴ)	その他・補足
バイシリンG顆粒40万単位	甘味	なし	あり	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ピクシリンドライシロップ10%	ミックスフルーツ	あり	なし	○	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	-	
パセトシン細粒10%	パイナップル	なし	少しあり	○	○	×	○	×	×	×	○	○	○	○	×	特有の香りがあり、溶かすと香りが強くなる
ワイドシリン細粒20%	ミックスフルーツ	なし	なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	特有の香りがある、甘い
クラバモックス小児用配合ドライシロップ	ストロベリークリーム	なし	なし	○	○	○	×	-	×	○	○	○	○	○	-	細粒が細かくむせることあり
ユナシン細粒小児用10%	コーラ	少しあり	あり	○	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	×	細粒をつぶすと苦味増強
ケフレックスシロップ用細粒100	オレンジ	少しあり	なし	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	×	
ケフラル細粒	オレンジ	なし	あり	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	
セフspan細粒	オレンジ	なし	少しあり	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	
メイアクトMS小児細粒10%	バナナ	少しあり	なし	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	溶かすと香りが強くなる
セフゾン細粒小児用10%	ストロベリー	なし	なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	吸収率低下のため、鉄剤とは3時間、制酸剤（A1、Mg含有）とは2時間服用間隔をとる。（粉ミルク、鉄剤と一緒に便が赤くなることがある）
クラリスドライシロップ10%小児用	ストロベリー	少しあり	なし	○	○	×	×	×	○	×	○	○	○	○	×	酸味のあるものと混ぜておくと苦味増強
ジシロマック細粒小児用	オレンジ・パイナップル	あり	なし	○	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	酸味のあるものと混ぜておくと苦味増強
エリスロシンドライシロップ10%	バナナ	少しあり	なし	○	○	×	×	×	○	×	○	○	○	○	×	酸味のあるものと混ぜておくと苦味増強
ミノマイシン顆粒2%	オレンジ	なし	なし	○	×	×	×	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	○	カルシウムを含有する飲食物、鉄剤と混ぜると吸収率低下。2時間服用間隔をとる。
バクタミン配合顆粒	無味	あり	あり	○	○	×	×	○	×	×	○	○	○	○	×	顆粒を噛んだり、つぶすと苦味増強
ホスミシンドライシロップ	カルピス	なし	なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
オゼックス細粒小児用15%	ストロベリー	なし	なし	○	○	×	○	×	NG	NG	NG	NG	NG	NG	○	カルシウムを含有する飲食物、鉄剤と混ぜると吸収率低下。2時間服用間隔をとる。
ファロム顆粒10%	オレンジ	なし	なし	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	特有な味柑橘系
アシクロビル顆粒40%	無味	なし	あり	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	無味ざらつきが残って飲みにくい
タミフルドライシロップ	ミックスフルーツ	あり	なし	○	×	○	×	×	○	○	○	×	○	×	○	

参考資料

日本小児総合医療施設協議会（JACHRI）：乳幼児・小児服薬介助ハンドブック、2013

薬局2012Vol.63 No.3

日経メディカルオンライン 散剤と服用補助食品の飲み合わせ（味）一覧表（シオ薬局グループ作成）

○：飲みやすい ×：飲みにくい NG：混合不可 -：データなし